

◎ 指示があるまで開かないこと。

#### 注意事項

1. [1] [4] の各問題に適した答えを一つ選び、次の例にならって解答用紙に記入すること。

(例) 問題 0 0 県庁所在地はどれか。

- ① 栃木市
- ② 川崎市
- ③ 神戸市
- ④ 倉敷市

正解が③であるとすると、解答用紙の③をマークして

① ② ● ④ とすればよい。

答案の作成には鉛筆を使用し、濃くマークすること。

良い解答の例 · · · ●

悪い解答の例 · · · ○ ⊖

答えを修正した場合は、必ず「消しゴム」あとが残らないように完全に消すこと。鉛筆の色が残ったり、「●」のような消し方などをした場合は、修正したことにならないので注意すること。

2. [2] [3] [5] 直接解答用紙に記入する。

# 八女筑後看護専門学校・看護科

## 2021年度生 一次 入学試験問題（専門科目）

（※ 答はすべて解答用紙に記入しなさい。）

### 1 下記の設問に答えなさい。

1. 看護理論と理論家の組み合わせについて誤っているのはどれか。

- ① 自然治癒力に働きかける看護 \_\_\_\_\_ ナイチンゲール
- ② ニードに基づいた看護 \_\_\_\_\_ ヘンダーソン
- ③ 適応を促す看護 \_\_\_\_\_ ワトソン
- ④ ケアリングを基盤とした看護 \_\_\_\_\_ ベナー

2. 保健師助産師看護師法について正しいのはどれか。

- ① 准看護師が麻薬、大麻またはあへんの中毒者であった場合は、厚生労働大臣は処分をことができる。
- ② 准看護師は、正当な理由がなくその業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないが、准看護師でなくなった後においてはこの限りではない。
- ③ 准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- ④ 業務に従事する准看護師は、3年毎に就業地の都道府県知事に届け出なければならぬ。

3. 一時的・持続的導尿について正しいのはどれか。

- ① 挿入するカテーテルの長さは、女性7～9cm、男性23～25cm程度とする。
- ② カテーテル挿入時は、口呼吸を促す。
- ③ 男性の場合、陰茎を床面に対し60度になるように持ち、ゆっくりとカテーテルを挿入する。
- ④ 女性の場合、挿入後カテーテルを固定するときは、少しゆとりを持たせて下腹部に固定する。

4. 酸素吸入のための用具の種類と特徴について、誤っているのはどれか。

- ① 鼻カニューレ \_\_\_\_\_ 取り扱いが簡便で不快感や動作制限は比較的少ない。
- ② フェイスマスク \_\_\_\_\_ 酸素濃度が一定せず、鼻粘膜・口腔粘膜が乾燥しやすい。
- ③ ベンチュリーマスク \_\_\_\_\_ 酸素の加湿が必要である。
- ④ リザーバーマスク \_\_\_\_\_ 酸素濃度60%以上の高濃度で投与できる。

5. 検体の採取方法について、誤っているのはどれか。

- ① 24時間尿（蓄尿）は、開始時間から終了時間の全尿を採取する。
- ② 便検査で潜血検査を行う場合、肉類など血液の混じっている食物は摂取しない。
- ③ 咳痰の採取は、含嗽で口腔内を清潔にしてから行う。
- ④ 採血を行う場合、乳がんなどで腋窩リンパ節郭清をした側の腕では行わない。

6. 便秘のある患者への援助について、誤っているのはどれか。

- ① 適度な運動を促す。
- ② 十分な水分と食物繊維が多い食事をとるように指導する。
- ③ 毎日決まった時間にトイレに行くよう指導する。
- ④ 腹部や腰背部の冷罨法を行う。

7. 運動による身体への効果について、誤っているのはどれか。

- ① 心肺機能の維持
- ② カテコールアミンの分泌抑制
- ③ 骨形成の促進
- ④ 関節の変形予防

8. 病衣の条件について誤っているのはどれか。

- ① 皮膚を刺激しない素材で、肌ざわりがよいもの。
- ② 身体を締め付けず、体型に合った着脱のしやすいもの。
- ③ 吸湿性・通気性がよく、汚れが目立たない濃い色のもの。
- ④ 洗濯に耐えるじょうぶな素材で、帯電性のないもの。

9. 車椅子への移乗と移送の援助について、誤っているのはどれか。

- ① 快適な乗り心地と事故防止のため、使用前にはブレーキやタイヤの空気圧、シートの硬さを確認する。
- ② 患者の健側または利き手側に、ベッドに対して45度に配置しブレーキをかける。
- ③ スロープを上がるときは、患者が前向きになるように進み、下りるときは後ろ向きでゆっくり下りる。
- ④ エレベーターに乗るときは方向転換し、後ろ向きに乗る。

10. 手指衛生について正しいのはどれか。

- ① 流水と石鹼による手洗いは、汚れを十分に落とすために40~60秒かけて行う。
- ② 日常生活で何気なく行っている手洗いでは十分に洗浄されず、特に手掌は洗浄が不十分になりやすい。
- ③ 医療従事者は、手指衛生後にハンドクリームなどを塗ると感染源となるため控える。
- ④ 速乾性擦式消毒薬は、ポンプを半分押し下げた量で十分消毒効果が得られる。

11. 身体の観察について正しいのはどれか。


- ① 対象者の訴えから得られる情報を客観的情報、看護師が対象者を観察することで得られる情報を主観的情報という。
- ② 触診は看護師の手を使って対象者の身体に触れる方法であるが、脈を測定することは触診とは言わない。
- ③ 空気を多く含んだ肺を打診した場合に聞こえる音を、共鳴音という。
- ④ 聴診によって腸の動きを確認するためには、右下腹部など1か所に3分間聴診器を当てる。

12. 安全安楽について正しいのはどれか。


- ① マズローは安全について、低次から3階層目に位置し、欠くことのできない基本的欲求であると説明している。
- ② 安楽は、安全が守られていなくても最小限の安楽は保たれていることが多い。
- ③ 患者にフルネームで確認するだけで、患者誤認防止対策となる。
- ④ 2001年に「身体拘束ゼロへの手引き」が出され、緊急でやむを得ない場合を除いて、患者の行動を抑制する行為を行ってはならないとした。

13. 脈拍測定の方法で正しいのはどれか。


①




②



③



④



14. 看護記録について誤っているのはどれか。

- ① 看護記録に記載された情報は、看護行為を実践したり、評価するための資料となる。
- ② 看護サマリーは、患者の経過や情報について要点を簡潔にまとめたものであり、病棟や施設を変わる際に必要に応じて作成する。
- ③ クリティカルパスは、典型的な経過をたどる件数の少ない特定の疾患において、治療計画などを経時的に記したガイドラインである。
- ④ 病院における看護師によって記載される記録の保存期間は、2年とされている。

15. 次の症状がある患者の看護で、誤っているのはどれか。

- ① 脱水がある場合、悪化するとショックや腎不全にまで至ることがあるため、症状を注意深く観察する。
- ② 発熱がある場合、エネルギーを消耗し倦怠感が強くなるため、転倒・転落に注意する。
- ③ ショック時の体位は、水平仰臥位で下肢のみ拳上を原則とし、体位変換や移動は循環動態に影響を与えないようにゆっくり行う。
- ④ 痛みがある場合、不眠・疲労・不安などが痛みの閾値を上げる要因となるため、取り除くことが必要である。

16. 我が国の人団動態について正しいのはどれか。

- ① 2017（平成29）年の我が国の総人口は、1億1000万人である。
- ② 年齢3区別人口において、18～65歳を生産年齢人口という。
- ③ 2017（平成29）年の年少人口の割合は、老人人口の割合を大きく上回っている。
- ④ 近年、労働力人口の割合が減少し、大きな社会問題となっている。

17. 血液の働きについて正しいのはどれか。

- ① 栄養素や老廃物は、血球に溶けて運ばれる。
- ② 赤血球の中にあるヘモグロビンが肺で酸素と結合し、全身の組織に酸素を送り届ける。
- ③ 血小板は、病原体などから身体を防御する働きがある。
- ④ 血管壁が傷つくと、白血球が集まり互いにくつついで、破れた血管を一時的にふさぐ。

18. 次の組み合わせで誤っているのはどれか。

- |                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| ① ヘリコバクター・ピロリ菌  | _____ | 胃潰瘍  |
| ② シュニツツラー転移     | _____ | 胃がん  |
| ③ インターフェロン療法    | _____ | B型肝炎 |
| ④ ラジオ波焼灼療法（RFA） | _____ | 膵臓がん |

19. 股関節を屈曲するときに働く筋肉はどれか。

- ① 大殿筋
- ② 大腿二頭筋
- ③ 腸腰筋
- ④ 下腿三頭筋

20. 四肢切断時の看護で誤っているのはどれか。

- ① 上肢切断の場合、患肢が利き手であれば、利き手交換の練習をするよう指導する。
- ② 下肢切断の場合、松葉杖などの歩行訓練や筋力増強訓練を行っていく。
- ③ 切断肢の幻肢感、幻肢痛は、消失しないことを説明する。
- ④ 義肢にかかる負担を軽減するため、体重コントロールを行う。

21. 脳血管疾患で意識障害のある患者の看護について、誤っているのはどれか。

- ① 舌根沈下や吐物の誤嚥による閉塞を予防するために、側臥位とする。
- ② 必ずベッド柵をして身体拘束を行い、転落を予防する。
- ③ 経口摂取ができない場合は、輸液や経管栄養で水分・栄養を補給する。
- ④ 便秘や排便時の努責を避け、血圧上昇や頭蓋内圧亢進の防止に努める。

22. 次の文章で誤っているのはどれか。

- ① 進行性筋ジストロフィー症は、平滑筋が進行性に変性する原因不明の疾患である。
- ② ハンチントン病は、舞蹈運動と認知症を主症状とする優性遺伝性疾患である。
- ③ 多発性硬化症は、限局性の脱髓鞘病巣が次々と生じる疾患である。
- ④ パーキンソン病は、中脳の黒質から線条体への伝達物質であるドパミンの不足が原因である。

23. 歯・口腔疾患患者の看護について誤っているのはどれか。

- ① 外科的治療後の創部は、抜糸までブラッシングを避けて含嗽のみとする。
- ② 口腔内が腫脹し疼痛や熱感がある場合は、氷や冷却剤で急激に冷やす。
- ③ 矯正治療中の食事では、歯に付着しやすい食物やかたい食物に注意する。
- ④ 口腔内の出血が予測される場合は、入浴・飲酒・運動などは制限する。

24. 次の文章で正しいのはどれか。

- ① 健康な状態での肺の構造は、壁側胸膜と臓側胸膜はほぼ接触しており、その間の胸膜腔には何も存在しない。
- ② 全身を巡った静脈血は右心房→右心室→肺静脈→肺動脈→左心房→左心室を経て、全身にいきわたる。
- ③ 心臓の壁は3層構造で、心筋層が最も厚い。
- ④ 体重80kgの成人男性の全血液量は、約8Lである。

25. 肺結核患者の看護について正しいのはどれか。

- ① 内服治療を行う際は、直接服薬確認療法（DOTS）体制を強化する。
- ② 結核薬であるストレプトマイシンの副作用に視力障害があるため、患者の訴えや症状に注意して早期発見に努める。
- ③ 看護師はサージカルマスクを必ず着用する。
- ④ 免疫力を高め肺の働きを強化するために、運動するよう指導する。

26. 心臓の手術を受ける患者の看護について、誤っているのはどれか。

- ① 手術後は循環動態が安定するまでは、体位変換を行わないことを術前オリエンテーションで伝えておく。
- ② 人工呼吸器からの離脱（ウェーニング）が行われた後は、酸素療法に切り替え、酸素濃度は医師の指示に従って調整する。
- ③ 心タンポナーデは手術後5日目ごろに起こりやすいため、排液の状況を観察する。
- ④ 健康教育は、塩分などの食事制限や発作出現時の対処法、便秘予防など多岐にわたるため、多職種との連携が必要である。

27. 加齢による生理機能の変化について、誤っているのはどれか。

- ① 循環器系では、血管壁の弾力性が低下し、内腔狭窄がみられ拡張期血圧が上昇する。
- ② 呼吸器系では、喉頭蓋の反射の低下と気道粘膜の線毛運動の低下により、誤嚥性肺炎になりやすい。
- ③ 消化器系では、胃壁の運動や腸管の蠕動運動の低下により、便秘を起こしやすくなる。
- ④ 代謝系では、骨格筋量が減少することで基礎代謝量が低下する。

28. 認知症のある高齢者への対応で、誤っているのはどれか。

- ① 暴力を受けそうになったら、手で押さえるのではなく、そっと手や腕を包み込む。
- ② 異食がある場合は、口に入れると危険な物は気づかれない場所に移動し、目に触れないようにする。
- ③ 物とられ妄想がある場合は、そもそも持っていたことをわかつてもらえるよう説得する。
- ④ 入浴に対して抵抗がある場合は、観念や生活習慣などをアセスメントし対応する。

29. 運動機能の発達について誤っているのはどれか。

- ① 1歳 ━━━━━ ひとり立ちができる
- ② 2歳 ━━━━━ ひとりで階段昇降ができる
- ③ 3歳 ━━━━━ 片足立ちができる
- ④ 4歳 ━━━━━ スキップができる

30. 子どもと家族に関する法律について、誤っているのはどれか。

- ① 1951（昭和26）年 ━━━━━ 児童憲章
- ② 1965（昭和40）年 ━━━━━ 児童福祉法
- ③ 1994（平成6）年 ━━━━━ エンゼルプラン
- ④ 2000（平成12）年 ━━━━━ 健やか親子21

31. 小児の成長・発達と生理について、誤っているのはどれか。

- ① 白血球数は、新生児期に最も多くその後徐々に減少する。
- ② 生後3か月までの1日の体重増加は、平均25～30gである。
- ③ 永久歯は乳幼児期につくられ、6～7歳ころに第1大臼歯からはえはじめる。
- ④ 成長スパートがピークに達する時期は、男児は12歳前後、女児は14歳前後である。

32. 1歳0か月の幼児の標準的な身長と体重の組み合わせで、正しいのはどれか。

- ① 身長55cm ━━━━━ 体重6kg
- ② 身長60cm ━━━━━ 体重7kg
- ③ 身長75cm ━━━━━ 体重9kg
- ④ 身長90cm ━━━━━ 体重10kg

33. 乳がんについて誤っているのはどれか。

- ① 初経が早く初産年齢や閉経が遅く、出産数が少ないものに罹患する率が高い。
- ② 好発年齢は40～60歳代である。
- ③ 腫瘍は表面凹凸不整で硬い。
- ④ 乳頭を中心に、乳房を4分割した外側下方部に発生する頻度が高い。

34. 思春期女子の特徴について、正しいのはどれか。


- ① 第二次性徴では初経から始まり、乳房の発達、恥毛の発育がおこる。
- ② 初経後の数年間は、無排卵性月経が多い。
- ③ 第二次性徴に関与するホルモンは、副腎皮質ホルモンである。
- ④ 近年、性器クラミジア感染症の罹患率は15～19歳の女子に多く、疼痛と出血の症状がみられる。

35. 分娩の生理について、誤っているのはどれか。
- ① 産道は、骨産道と軟産道からできている。
  - ② 娩出力とは、胎児及びその付属物を娩出させる力のことをいう。
  - ③ 産微とは子宮頸管が開大し、卵膜が子宮壁から剥離して脱落膜血管が破綻するためにおこる出血である。
  - ④ 分娩陣痛とは、分娩開始直前におこる弱い子宮収縮のことである。
36. ビショップスコアを評価するために、必要ではない情報はどれか。
- ① 児頭の位置
  - ② 子宮頸管の開大度
  - ③ 回旋の状態
  - ④ 子宮口の位置
37. 産褥1日目の褥婦の経過について、正しいのはどれか。
- ① 子宮底は臍下3横指である。
  - ② 悪露は淡黄色である。
  - ③ 乳房は左右ともに腫脹し、発赤を認める。
  - ④ 分娩後、尿閉が現れることがある。
38. 生後5日目の新生児の生理について、正しいのはどれか。
- ① 便は暗緑色で無臭である。
  - ② 体重減少率は15%程度である。
  - ③ 呼吸数は40~50回/分である。
  - ④ モロー反射が消失する。
39. 精神科看護師に求められるものについて、誤っているのはどれか。
- ① 看護そのものが、患者の精神状態に大きな影響を与えることを理解しておく。
  - ② 精神に障害をもつ患者の人権を擁護する姿勢を持つ。
  - ③ 患者が「つらい」「悲しい」と感じているときは、声をかけずに遠くから見守る。
  - ④ 患者の病的な側面だけでなく、健康な側面にも関心を向ける。
40. 精神保健福祉法の改正において誤っているのはどれか。
- ① 精神障害者の社会復帰の促進
  - ② 保護者制度の導入
  - ③ 国民の精神保健の向上
  - ④ 精神障害者保健福祉手帳の創設
41. 自閉症スペクトラム障害（ASD）について誤っているのはどれか。
- ① 社会性の障害
  - ② コミュニケーションの障害
  - ③ 社会的イマジネーション（想像性）の障害
  - ④ 運動機能の障害

2

下記の設間に答えなさい。

1. 下記の文章の（　　）内に、適切な語句を書きなさい。
  - ・准看護師とは、都道府県知事の免許を受けて「医師、歯科医師又は看護師の指示を受け、傷病者若しくはじょく婦に対する（①）または（②）を行うことを業とする者」をいう。
2. 包帯法の目的について（　　）に適切な語句を記入しなさい。
  - （①）；患部をおおい、病原体や物理的・化学的刺激から保護する。
  - （②）；出血部の止血を図ったり、浮腫や腫脹の消退を図る。
3. 感染の3要素について、下記の（　　）に適切な語句を答えなさい。
  - ・感染の成立には、（①）（②）（③）の3つの要素が必要であり、これらを制御することが感染予防策として重要である。
4. 慢性期について（　　）の中に適切な語句を記入しなさい。
  - ・長い経過の中には、病気がコントロールされ症状が落ち着いている時期があり、この時期を（①）期という。反対に体調の変化やコントロールの失敗により、著明な症状を伴って再発する時期を（②）期という。
5. グレーヴス病（バセドウ病）にみられるメルゼブルグの3徴候を書きなさい。
  - （①）（②）（③）
6. （　　）に適切な語句を記入しなさい。



- ・国際生活機能分類（ICF）における「生活機能」は、心身機能・身体構造、（③）、（④）の3要素で構成される。

7. 次の文章の（　　）に適切な言葉を書きなさい。
- ・実在しない対象を知覚する「対象なき知覚」の体験を（　①　）という。
  - ・ある判断が誤った推論によって行われ、現実のできごと明らかに食い違っている状態を（　②　）という。
8. 毒薬・劇薬の表示について、（　　）に適切な語句を記入しなさい。
- ・毒薬；（①）地に（②）枠、（③）字で品名及び「毒」と記載する。
  - ・劇薬；（④）地に（⑤）枠、（⑥）字で品名及び「劇」と記載する。

3 下記の設間に答えなさい。

精神病院への入院形態について正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

- (　　) ① 任意入院では、精神保健指定医が入院を継続する必要があると認めた場合には、72時間に限り退院を制限することができる。
- (　　) ② 措置入院では、精神症状が激しく自傷他害の恐れがある場合、市町村長の責任で入院保護ができる。
- (　　) ③ 緊急措置入院では、指定医が1人しかいない場合、都道府県知事は24時間を限度に入院を命じることができる。
- (　　) ④ 医療保護入院では、指定医が入院治療の必要性を判断した場合、本人の同意がなくても家族等の同意で入院させることができる。
- (　　) ⑤ 応急入院では、指定医が直ちに入院が必要と認めた場合、本人や家族等の同意がなくても、72時間に限り応急入院指定病院に入院させることができる。

4 下記の設間に答えなさい。

1. 経管栄養チューブの挿入について正しいのはどれか。
- a 挿入途中で患者の口腔内を観察し、チューブがとぐろを巻いていないか確認する。
  - b 挿入中、チューブ内に呼吸に伴うくもりがあれば、抜去し再挿入する。
  - c チューブは、引っ張られて抜けないようにゆとりをもたせず、頬に固定する。
  - d チューブ挿入後は、抜去予防のために体動が制限されることを説明する。

①a, b    ②b, c    ③c, d    ④a, d

2. 与薬について正しいのはどれか。
- a 体内に入った薬物は、吸収→分布→代謝→排泄という過程を経る。
  - b 薬物の持続時間は、静脈内、吸入、筋肉内、皮下、内服の順で短くなる。
  - c 薬物が全身を循環する前に、肝臓で代謝を受けることを初回通過効果という。
  - d 薬物による生体の生理機能の変化を薬理作用という。

①a, b    ②b, c    ③c, d    ④a, d

3. 栄養素と栄養評価について、正しいのはどれか。

- a 三大栄養素はタンパク質、ミネラル及び糖質である。
- b 必須アミノ酸は9種類である。
- c 患者の栄養状態を知るための指標に体格指数がある。
- d 栄養素の摂取量の基準に「食生活指針」がある。

① a, b    ② b, c    ③ c, d    ④ a, d

4. 排尿障害について誤っているのはどれか。

- a 無尿とは、1日の尿量が300ml以下の場合をいう。
- b 完全尿閉とは、膀胱内に貯留した尿が排泄されない状態である。
- c 腹圧性尿失禁とは、咳やくしゃみ、重い荷物を持ち上げたときなどに尿を漏らすことである。
- d 機能性尿失禁とは、膀胱に尿がたまると強い尿意を生じ、排尿反射を我慢できない状態である。

① a, b    ② b, c    ③ c, d    ④ a, d

5. 入浴の援助について誤っているのはどれか。

- a 空腹時や食事直後の入浴は避ける。
- b バイタルサイン測定は入浴前後に行う。
- c 湯の温度は35~37°Cとする。
- d 脱衣室の室温は30°C前後とする。

① a, b    ② b, c    ③ c, d    ④ a, d

6. 療養環境の調整について誤っているのはどれか。

- ① 快適な環境の温度を至適温度といい、患者の病状や体型などにあわせて室温を調整する。
- ② 室内の環境には、温度と湿度に加えて気流が強く関係しており、この3つの要素が組み合わさって感覚的な温かさや涼しさを感じる。
- ③ 病室で最低限維持すべき照度は、100ルクス(lx)とされているが、読書や転倒予防にはより高い照度が必要である。
- ④ 快適な生活環境を保障するために、療養施設地域では昼間は55デシベル(dB)、夜間は45デシベル(dB)以下に定められている。

7. 睡眠中の生体の変化について正しいのはどれか。

- a レム睡眠時の呼吸は不規則で、回数はノンレム睡眠時より減少する。
- b ノンレム睡眠では心拍数、血圧とともにレム睡眠より上昇する。
- c 咳嗽反射や血管運動反射、瞳孔反射は保たれている。
- d 体温は入眠とともに下降し始め、午前2~6時頃が最も低くなる。

① a, b    ② b, c    ③ c, d    ④ a, d

8. 泌尿器疾患について正しいのはどれか。

- a 尿路結石症は顕微鏡的血尿が必発であり、尿管内に移行すると痙攣発作が生じる。
- b 膀胱腫瘍の3徴候は、血尿、腫瘍、疼痛である。
- c 前立腺肥大症は尿道に面した内腺部が萎縮し、尿道を圧迫することにより排尿障害が生じる。
- d 前立腺がんは中心部よりも周辺部に発生することが多いため、ある程度進行してから排尿障害が出現する。

①a, b    ②b, c    ③c, d    ④a, d


9. アレルギー疾患の症状と看護について、正しいのはどれか。

- a アナフィラキシーショック症状に陥った場合は、心肺停止に備え準備しておく。
- b 皮疹が生じ搔痒感を伴うことが多いため、温かい飲食物を摂取し保温する。
- c 呼吸器症状は、アレルゲンが気道に入るとIgG型の抗体が産生されることで起こり、呼吸困難が出現した場合は、胸式呼吸をさせる。
- d 消化器症状を起こすアレルゲンとなる食品は、患者、家族に摂取しないよう指導する。


①a, b    ②b, c    ③c, d    ④a, d

10. 右中葉に痰が貯留しているときの体位ドレナージはどれか。


①




②



③



④



出典：新看護学9 成人看護〔1〕医学書院P 137

11. 成年後見制度について誤っているのはどれか。

- a 判断能力が十分でなくなると財産管理が難しくなるために、不当な不利益を被らないように保護する制度であり、認知症のみの適応となる。
- b 法定後見制度の「後見」の対象者は、判断能力が不十分なものである。
- c 任意後見制度とは、判断能力が十分にある人が、あらかじめみずから後見人を選ぶ制度である。
- d 法定後見人は家庭裁判所が選任する。

①a, b    ②b, c    ③c, d    ④a, d